



Annexe VI

LISTE DES OISEAUX SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OBSERVÉS DANS LE TERRITOIRE À L'ÉTUDE DU PROJET DE PARC NATIONAL D'OPÉMICAN

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
GAVIIDAE				
<i>Gavia immer</i>	Plongeon huard	Lacs, eau libre et profonde.	Fréquent sur le lac Kipawa.	2, 3, 4
PODICIPEDIDAE				
<i>Podiceps grisegena</i>	Grèbe jougris	Lacs peu profonds, baies et étangs entourés de plantes émergentes.		2
<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré	Lacs peu profonds, étangs, marais, ruisseaux, eau libre avec herbiers aquatiques.		3, 4
PHALACROCORACIDAE				
<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormoran à aigrettes	Lacs, rivières.		2, 3, 4
ARDEIDAE				
<i>Botaurus lentiginosus</i>	Butor d'Amérique	Marais, marécages, aulnaies, saulaies.		2, 4
<i>Ardea herodias</i>	Grand héron	Plans d'eau, boisés isolés.	Petite colonie dans le secteur de l'île aux Fraises.	2, 3, 4, 5
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	Massifs feuillus, boisés mixtes avec bosquets de conifères, proximité des grands plans d'eau.		2, 4
ANATIDAE				
<i>Cygnus buccinator</i>	Cygne trompette	Niche au nord-ouest du Canada. Visiteur exceptionnel au Québec.	Observation d'un individu bagué en 1993.	2
<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	Tourbières, toundra. Niche au nord du Québec.		2, 3
<i>Aix sponsa</i>	Canard branchu	Forêts humides, arbres creux, cavités.		2, 3, 4
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	Terrains herbeux, près à carex, proximité des plans d'eau.		2, 4
<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	Cours d'eau, forêts mixtes et de conifères.		2, 3, 4
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	Habitats variés, étangs, lacs.		2, 3, 4
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	Eau peu profonde, marécages.		4
<i>Anas discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	Eau peu profonde et terrains secs à proximité.		2, 4
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	Lacs, marais, étangs peu profonds, présence d'herbiers aquatiques et de berges herbeuses.		4
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	Marais peu profonds, étangs, niche sous une végétation dense.		4
<i>Anas americana</i>	Canard d'Amérique	Lacs peu profonds, végétation émergente peu abondante.		2, 4
<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier	Boisés mixtes et de conifères, eau peu profonde.		2, 3, 4
<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan	Lacs, étangs, eau peu profonde, toundra. Niche dans la forêt boréale.		2
<i>Clangula hyemalis</i>	Harelde kakawi	Fréquente les milieux d'eau douce ou salée selon la saison. Niche au nord du Québec.		2

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	Petits lacs, forêts de conifères matures, cavités.		2, 4
<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	Lacs, étangs. Rare au Québec.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	2
<i>Bucephala albeola</i>	Petit garrot	Lacs, étangs peu profonds de préférence alcalins.		2, 4
<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné	Eau claire, étangs, lacs, rivières près de forêts, arbres creux.		2, 4
<i>Mergus merganser</i>	Grand harle	Forêts à proximité des plans d'eau claire, évite les lacs de montagne isolés.	Fréquent sur le lac Kipawa.	2, 3, 4
<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé	Lacs, rivières, baies, niche en bordure de ces plans d'eau.		4
CICONIIDAE				
<i>Cathartes aura</i>	Urubu à tête rouge	Forêts feuillues ou mixtes à proximité des zones agricoles, vallées, escarpements rocheux, éboulis.	Fréquent aux environs de Laniel et dans le couloir de la rivière Kipawa.	2, 3, 4
ACCIPITRIDAE				
<i>Pandion haliaëtus</i>	Balazard pêcheur	Eau peu profonde, arbres de grande taille.		2, 3, 4
<i>Haliaëtus leucocephalus</i>	Pygargue à tête blanche	Plans d'eau poissonneux, arbres de grande taille, lieux isolés.	Espèce vulnérable au Québec.	2, 3, 4
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-Martin	Milieus ouverts, terres humides, marais, tourbières, secteurs de coupe forestière, brûlis.		2, 3, 4
<i>Accipiter striatus</i>	Épervier brun	Forêts mixtes ou de conifères denses et peuplements jeunes, proximité des clairières, milieux ouverts.		2, 4
<i>Accipiter cooperii</i>	Épervier de Cooper	Milieus forestiers à proximité d'un plan d'eau.		2
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	Forêt préférentiellement mature avec un couvert dense et un sous-bois éclairci.		4
<i>Buteo platypterus</i>	Petite buse	Forêts feuillues ou mixtes en bordure des clairières et près des plans d'eau.	Fréquent dans le territoire d'étude.	2, 3, 4
<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse	Grands arbres des forêts clairsemées et proximité des clairières.		2, 4
<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue	Terrains découverts. Niche en milieu boréal.		2, 3
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	Combinaison de milieux ouverts et de falaises en milieu isolé. Peu fréquent.	Espèce vulnérable au Québec.	2, 3
FALCONIDAE				
<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	Habitats ouverts variés (champs, trouées, secteurs de coupe, brûlis).		2, 3, 4
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	Forêts discontinues, prairies boisées, rives de lacs, tourbières.		2, 3, 4
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	Privilégie les falaises à proximité des plans d'eau. Peut nicher au sol ou sur les arbres.	Espèce vulnérable au Québec. Observé à maintes reprises sur les falaises des lacs Kipawa et Témiscamingue. Nicheur confirmé.	2, 3, 4, 5
<i>Falco rusticolus</i>	Faucon gerfaut	Habitats ouverts, niche sur les falaises et les affleurements rocheux de l'Arctique. Visiteur rare au sud du Québec.		2



Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
PHASIANIDAE				
<i>Falciennis canadensis</i>	Tétras du Canada	Forêt boréale, préférence pour les peuplements dominés par l'épinette noire et le sapin baumier.		3, 4
<i>Bonasa umbellus</i>	Gélinotte huppée	Peuplements feuillus ou mixtes, lisières des forêts et des cours d'eau, lieux perturbés.		2, 3, 4
RALLIDAE				
<i>Rallus limicola</i>	Râle de Virginie	Marais à quenouilles, carex et joncs, bords marécageux des lacs et des rivières, prés humides.		4
<i>Porzana carolina</i>	Marouette de Caroline	Marais.		2, 4
<i>Fulica americana</i>	Foulque d'Amérique	Marais, étangs.		4
CHARADRIIDAE				
<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir	Lieux ouverts, végétation éparse, fossés, sites perturbés.		2, 4
SCOLOPACIDAE				
<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand chevalier	Tourbières de la forêt boréale et plus rarement celles des régions boisées du Québec méridional.		2
<i>Tringa flavipes</i>	Petit chevalier	Niche rarement au Québec, observations confinées à quelques tourbières de la baie James et de la baie d'Hudson. Migrateur commun à l'automne. Rare au printemps.		2
<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	Milieux humides, en forêt boréale, utilise les nids abandonnés de passereaux.		2, 4
<i>Actitis macularia</i>	Chevalier grivelé	Plages, clarières, rivages, fossés. Général au Québec sauf au Nunavik.		2, 3, 4
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	Holarctique. Tourbières, marais d'eau douce, champs inondés, couvert végétal bas.		2, 4
<i>Scolopax minor</i>	Bécasse d'Amérique	Associé aux zones agricoles du Québec méridional. Habitat complexe : combinaison de sol humide, de végétation arbustive et proximité de points d'eau, trouées dans la forêt.		2, 4
LARIDAE				
<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé	Habitats variés, milieux humanisés, rives des lacs et des rivières. Niche en colonie.		2, 3, 4
<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	Îles, bordures de lacs et falaises. Niche en colonie.		2, 3, 4
<i>Larus hyperboreus</i>	Goéland bourgmestre	Holarctique. Niche en colonie dans l'Arctique. Occasionnel le long de la rivière des Outaouais en période hivernale.		2
<i>Larus marinus</i>	Goéland marin	Habitat maritime, îles et falaises. Niche en colonie.		2, 4
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	Proximité d'un plan d'eau important, eau douce ou salée, végétation basse et clairsemée, langues de sable, jetées. Niche en colonie.		2, 4
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	Niche dans les marais, étangs, marécages des milieux intérieurs. Niche en colonie.		2, 4

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
COLUMBIDAE				
<i>Columba livia</i>	Pigeon biset	Milieu urbain et rural.		2, 4
<i>Zenaida macroura</i>	Tourterelle triste	Boisés clairsemés, plantations.		2, 4
COCCYZIDAE				
<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Coulicou à bec noir	Clairières, bordure des forêts, bois jeune. Peu abondant au Québec.	Abondant au Témiscamingue.	2, 4
STRIGIDAE				
<i>Bubo virginianus</i>	Grand-duc d'Amérique	Habitats variés : lisières et ouvertures dans les forêts, près de grands plans d'eau.		2, 4
<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière	Forêts de conifères claires, boisés mixtes. Niche au nord du 47 ^e parallèle.		2
<i>Strix varia</i>	Chouette rayée	Forêts feuillues ou mixtes, matures avec arbres à cavités.		4
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	Lisière des forêts mixtes ou de conifères denses, zone reboisée.		4
<i>Asio flammeus</i>	Hibou des marais	Milieus ouverts, tourbières, zones riveraines, marécageuses ou sableuses.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	4
<i>Nyctea scandiaca</i>	Harfang des neiges	Milieus ouverts (nombreux rongeurs). Niche au nord du Québec. Visiteur hivernal.		2
<i>Aegolius acadicus</i>	Petite nyctale	Forêts riveraines, forêts denses, boisés humides.		4
CAPRIMULGIDAE				
<i>Chordeiles minor</i>	Engoulevent d'Amérique	Milieus ouverts : plages, brûlis, friches, champs, secteurs de coupe, forêts feuillues ou mixtes.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	2, 4
<i>Caprimulgus vociferus</i>	Engoulevent bois-pourri	Forêts avec ouvertures, proximité de clairières ou de champs cultivés.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	4
TROCHILIDAE				
<i>Archilochus colubris</i>	Colibri à gorge rubis	Habitats ouverts, clairières, bordure des forêts feuillues et mixtes, vergers.		2, 3, 4
CERYLIDAE				
<i>Ceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	Milieus aquatiques variés, rivages sableux. Niche dans les escarpements de dépôts meubles.		2, 3, 4
PICIDAE				
<i>Sphyrapicus varius</i>	Pic maculé	Forêts feuillues ou mixtes matures, près d'éclaircies et de points d'eau.		2, 3, 4
<i>Picoides pubescens</i>	Pic mineur	Forêts décidues ou mixtes, boisés jeunes. Commun.		2, 4
<i>Picoides villosus</i>	Pic chevelu	Forêts décidues ou mixtes, matures et denses. Commun.		2, 3, 4
<i>Picoides articus</i>	Pic à dos noir	Forêt de conifères, forêts décimées par le vent ou les brûlis avec des chicots.		4
<i>Colaptes auratus</i>	Pic flamboyant	Forêts feuillues ou de conifères clairsemées, brûlis, lisières des champs. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4



Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Dryocopus pileatus</i>	Grand pic	Forêts mixtes, décidues ou de conifères, âgées, chicots, arbres de grande taille.	Courant sur le territoire d'étude et au Témiscamingue, associé aux peuplements de pin rouge et de pin blanc.	2, 3, 4
TYRANNIDAE				
<i>Contopus borealis</i>	Moucherolle à côtés olive	Typique de la forêt coniférienne ou mixte ouverte, perchoirs dans les grands arbres.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	2, 4
<i>Contopus virens</i>	Pioui de l'est	Trouées et bordure des forêts feuillues ou mixtes.		4
<i>Empidonax flaviventris</i>	Moucherolle à ventre jaune	Forêts humides mixtes ou de conifères. Peu commun au Québec.		2, 4
<i>Empidonax alnorum</i>	Moucherolle des aulnes	Milieux humides arbustifs, rives des lacs.		2, 4
<i>Empidonax minimus</i>	Moucherolle tchébec	Forêts denses, feuillues ou mixtes.		2, 4
<i>Sayornis phæbe</i>	Moucherolle phébi	Forêts mixtes et décidues jeunes, proximité de milieux ouverts, parfois forêts de conifères.		2, 4
<i>Sayornis saya</i>	Moucherolle à ventre roux	Exceptionnel au Québec.		2
<i>Myiarchus crinitus</i>	Tyran huppé	Forêts matures dominées par des grands feuillus, absent en haute montagne.		4
<i>Tyrannus tyrannus</i>	Tyran tritri	Habitats variés : milieux ouverts agricoles, rivages, marais, étangs, lisières ou éclaircies en forêt mixte ou feuillue.		2, 4
HIRUNDINIDAE				
<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore	Habitats variés : terrains découverts, arbres morts, près de plans d'eau.		2, 4
<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Hirondelle à ailes hérissées	Berges, talus de sable, d'argile et de gravier, cavités dans falaise rocheuse, structures artificielles (pont).		4
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	Falaises, talus de sable ou d'argile, proximité de plans d'eau. Niche en colonie.		2, 3, 4
<i>Hirundo pyrrhonata</i>	Hirondelle à front blanc	Falaises, talus, structures artificielles (ponts, toitures). Niche en colonie.		2, 4
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	Milieux ouverts variés : fermes et proximité des cours d'eau, saillies rocheuses, grottes, bâtiments. Abondant en milieu rural.		2, 4
APODIDAE				
<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur	Arbres creux, cheminées, granges, silos.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	4
CORVIDAE				
<i>Perisoreus canadensis</i>	Mésangeai du Canada	Forêt de conifères, peuplements mixtes		2, 4
<i>Cyanocitta cristata</i>	Geai bleu	Habitats variés : forêts feuillues, mixtes ou conifériennes, milieux ouverts, agricoles ou périurbains.		2, 3, 4
<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corneille d'Amérique	Mélange d'habitats ouverts et boisés, agricoles, forêts, près des lacs.		2, 3, 4
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau	Habitats variés, secteurs montagneux près des escarpements.		2, 3, 4

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
PARIDAE				
<i>Parus atricapillus</i>	Mésange à tête noire	Typique des forêts mixtes ou feuillues		2, 3, 4
<i>Parus hudsonicus</i>	Mésange à tête brune	Forêts de conifères, aulnaies, tourbières.		2, 4
SITTIDAE				
<i>Sitta canadensis</i>	Sittelle à poitrine rousse	Forêts de conifères ou mixtes. Généralisé au Québec méridional jusqu'à la limite des arbres.		2, 3, 4
<i>Sitta carolinensis</i>	Sittelle à poitrine blanche	Étroitement associée à la forêt feuillue mais aussi en forêt mixte. Proximité des milieux ouverts.	Atteint la limite nordique de son aire de nidification au Témiscamingue.	2, 4
CERTHIIDAE				
<i>Certhia americana</i>	Grimpereau brun	Forêts feuillues mixtes ou conifériennes, matures, chicots et vieux arbres dont l'écorce se détache.		3, 4
<i>Troglodytes aedon</i>	Troglodyte familier	Milieux ouverts, fourrés, buissons, cavités.		4
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	Forêts conifériennes denses, proximité des ruisseaux, forêts marécageuses. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
REGULIDAE				
<i>Regulus satrapa</i>	Roitelet à couronne dorée	Typique des peuplements de conifères de la forêt boréale mais fréquente aussi les forêts feuillues ou mixtes dotées de conifères. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
<i>Regulus calendula</i>	Roitelet à couronne rubis	Boisés mixtes, boisés de conifères denses ou pessières clairsemées. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
MUSCICAPIDAE				
<i>Sialia sialis</i>	Merlebleu de l'Est	Milieux ouverts, champs, prés, brûlis, secteurs de coupe. Niche dans une cavité. Peu abondant au Québec.	Mention de nidification dans le territoire d'étude dans les années 1990.	2, 4
<i>Catharus fuscescens</i>	Grive fauve	Typique des forêts décidues, peuplements jeunes et en régénération, forêts mixtes, sites humides. Généralisé au sud du 49e parallèle.		2, 4
<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	Forêts de conifères matures ou mixtes, sites humides. Fréquente tout le Québec méridional sauf basses terres du Saint-Laurent.		2, 4
<i>Catharus guttatus</i>	Grive solitaire	Forêts mixtes ou conifériennes, boisés secs ou humides. Nicheur fréquent dans tout le Québec méridional.		2, 4
<i>Hylocichla mustelina</i>	Grive des bois	Forêts feuillue ou mixte, matures.		4
<i>Turdus migratorius</i>	Merle d'Amérique	Milieux ruraux, forêts de feuillus ou de conifères parsemées d'ouvertures. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
STURNIDAE				
<i>Dumetella carolinensis</i>	Moqueur chat	Végétation dense, fourrés, ravins, bordure de marais, friches, secteurs de coupe forestière. Limite septentrionale de nidification au Lac Saint-Jean. Peu abondant au Témiscamingue.		2, 4



Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Mimus polyglottos</i>	Moqueur polyglotte	Milieus ouverts, proximité des milieux habités. En expansion au Québec depuis années 1960. Peu abondant.		2, 4
<i>Toxostoma rufum</i>	Moqueur roux	Surtout associé à la forêt feuillue, buissons et haies, orée des bois, jeunes successions, milieux secs et bien drainés. Concentré dans les basses terres du Saint-Laurent. Peu abondant au Témiscamingue.		2, 4
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	Tous les types d'habitats ouverts ou semi-ouverts : villes, campagnes et boisés sauf les forêts denses. Généralisé au Québec méridional.	Naturalisé.	2, 4
BOMBYCILLIDAE				
<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	Habitats variés en milieu boréal. Visiteur hivernal irrégulier au Québec méridional.		2
<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique	Forêts mixtes ou feuillues, boisés clairs, bord de cours d'eau. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
LANIIDAE				
<i>Lanius excubitor</i>	Pie-grièche grise	Forêts conifériennes ouvertes des basses terres de la baie James et de la côte hudsonienne. Visiteur hivernal irrégulier au Québec méridional.		2
VIREONIDAE				
<i>Vireo solitarius</i>	Viréo à tête bleue	Forêts mixtes ou de conifères, strate arborescente avec éclaircies, sous-bois dense. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Vireo gilvus</i>	Viréo mélodieux	Feuillus matures et de grande taille en bordure des routes et des cours d'eau.		4
<i>Vireo philadelphicus</i>	Viréo de Philadelphie	Forêts feuillues ou mixtes, partie supérieure de la strate arborescente. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo aux yeux rouges	Forêts denses mixtes ou feuillues. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
FRINGILLIDAE				
<i>Vermivora peregrina</i>	Paruline obscure	Jeunes forêts mixtes ou de conifères, peuplements de feuillus, arbustives denses, tourbières. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Vermivora celata</i>	Paruline verdâtre	Boisés de feuillus clairsemés, clairières, brûlis en régénération. Rare au Québec.		2
<i>Vermivora ruficapilla</i>	Paruline à joues grises	Habitats variés : forêts mixtes ou de conifères, lisières des bois, tourbières. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Parula americana</i>	Paruline à collier	Forêts feuillues ou mixtes, matures ou surannées.		4
<i>Dendroica petechia</i>	Paruline jaune	Fourrés humides, fossés, bords de route, périphérie des éclaircies, bords de lacs. Québec méridional.		2, 4
<i>Dendroica pensylvanica</i>	Paruline à flancs marron	Milieus en régénération en bordure des forêts mixtes ou feuillues âgées. Généralisé au Québec méridional.		2, 4

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Dendroica magnolia</i>	Paruline à tête cendrée	Ubiquiste. Tous types de forêts comportant des massifs de conifères. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Dendroica tigrina</i>	Paruline tigrée	Forêts de conifères ou mixtes avec ouvertures.		4
<i>Dendroica caerulescens</i>	Paruline bleue	Forêts feuillues ou mixtes avec strate arbustive haute. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
<i>Dendroica coronata</i>	Paruline à croupion jaune	Forêts matures ou de transition, forêts conifériennes ou mixtes. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
<i>Dendroica virens</i>	Paruline à gorge noire	Forêts mixtes ou conifériennes, sapinières, peuplements de pins et de pruches. Généralisé au Québec méridional mais plus fréquente au sud.		2, 3, 4
<i>Dendroica fusca</i>	Paruline à gorge orangée	Forêts conifériennes, sapins, grands conifères. Généralisé au Québec méridional mais son abondance varie.		2, 4
<i>Dendroica pinus</i>	Paruline des pins	Étroitement associée aux forêts de pins matures.	Abondante dans les forêts de pins longeant le lac Témiscamingue. Limite nord de son aire de distribution.	2, 4
<i>Dendroica palmarum</i>	Paruline à couronne rousse	Tourbières, brûlis, feuillus intolérants de la forêt boréale. Au Québec méridional surtout en migration.		2
<i>Dendroica castanea</i>	Paruline à poitrine baie	Forêts de conifères matures et boisés mixtes. Généralisé au Québec méridional. Peu abondante dans la région de Montréal et bas Outaouais. Abondance liée au cycle de la tordeuse des bourgeons de l'épinette.		2, 3, 4
<i>Dendroica striata</i>	Paruline rayée	Forêts de conifères ouvertes, repousses de secteurs bûchés ou brûlés.		4
<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc	Forêts feuillues ou mixtes, sols humides. Généralisé au Québec méridional mais son abondance varie.		2, 3, 4
<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	Boisés feuillus en régénération, lisière de forêts, marécages. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Seiurus aurocapillus</i>	Paruline couronnée	Forêts feuillues, mixtes ou conifériennes, matures et fermées. Généralisé au Québec méridional mais moins fréquente au-delà du 49 ^e parallèle.		2, 4
<i>Seiurus noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	Forêts en bordure de milieux humides, étangs, lacs ou ruisseaux. Généralisé au Québec méridional. Moins abondante dans les basses terres région de Montréal.		2, 4
<i>Oporornis agilis</i>	Paruline à gorge grise	Peupleraies, tourbières à épinettes, pessières clairsemées, pinèdes grises.		4
<i>Oporornis philadelphia</i>	Paruline triste	Milieux forestiers variés comprenant des ouvertures, strate arbustive dense. Généralisé au Québec méridional. Moins abondante sur la Côte Nord.		2, 4
<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée	Milieux ouverts, broussailles, bordure de lacs et de rivières. Généralisé au Québec méridional.		2, 4



Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Wilsonia pusilla</i>	Paruline à calotte noire	Habitats humides en bordure de forêts de conifères boréales. Peu abondante au sud du Québec.		2, 4
<i>Wilsonia canadensis</i>	Paruline du Canada	Forêts mixtes, ouvertes à strate arbustive développée et à prédominance feuillue. Peu courante au nord du 49e parallèle.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	2, 4
<i>Piranga olivacea</i>	Tangara écarlate	Forêts décidues et mixtes matures (érable, chêne, hêtre et pruche). Voûte forestière haute et dense. Surtout présent au sud-ouest du Québec.		2, 4
<i>Pheuctitus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose	Forêts secondaires ouvertes, boisés en régénération, lisières de forêts matures décidues ou mixtes. Généralisé et abondant au sud du 48e parallèle.		2, 4
<i>Passerina cyanaea</i>	Passerin indigo	Domaine de la forêt feuillue, habitats riverains, clairières et ouvertures. Principalement au sud-ouest du Québec. Peu commun.		2, 4
<i>Spizella arborea</i>	Bruant hudsonien	Toundra arbustive. Commun en migration au Québec méridional.		2, 3
<i>Spizella passerina</i>	Bruant familier	Habitats ouverts comportant des massifs d'arbres à proximité Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Poocetes gramineus</i>	Bruant vespéral	Au sol en milieu ouvert. Surtout associé aux basses terres du Saint-Laurent, à l'Estrie et au cours inférieur de l'Outaouais. Peu commun.		2, 4
<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés	Milieux ouverts, plantes herbacées, arbustes, marais. Au Québec méridional principalement basses terres du Saint-Laurent, Outaouais, Appalaches et Abitibi-Témiscamingue.		2, 4
<i>Ammodramus leconteii</i>	Bruant de Le Conte	Milieux ouverts, strate herbacée dense. Sporadique dans les basses terres du Saint-Laurent. Migrateur. Rare.	Un individu a déjà été bagué à la station de baguage du marais Laperrière.	2
<i>Melospiza melodia</i>	Bruant chanteur	Milieux ouverts : buissons près de l'eau, lisière des forêts. Généralisé Québec méridional. Moins abondant à partir du 48e parallèle.		2, 4
<i>Melospiza lincolni</i>	Bruant de Lincoln	Milieux isolés, bordures de cours d'eau et d'éclaircies, tourbières. Généralisé au Québec méridional. Son abondance croît avec la latitude. Peu abondant au Témiscamingue.		2, 4
<i>Melospiza georgiana</i>	Bruant des marais	Milieux humides, arbustives, plantes herbacées hautes. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche	Forêts mixtes et de conifères. Généralisé au Québec méridional.		2, 3, 4
<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche	Arbustes et bosquets de la taïga et de la toundra. Migrateur.		2
<i>Junco hyemalis</i>	Junco ardoisé	Forêts mixtes ou de conifères, lisières, clairières. Généralisé et courant au Québec méridional.		2, 3, 4
<i>Calcarius lapponicus</i>	Bruant lapon	Toundra, sol humide, touffes herbeuses. Migrateur peu commun.		2
<i>Plectrophenax nivalis</i>	Bruant des neiges	Niche dans les milieux ouverts de l'Arctique. Migrateur. Commun.		2

Nom latin*	Nom français*	Habitat et aire de nidification ¹	Particularité	Sources
<i>Dolichonyx oryzivorus</i>	Goglu des prés	Champs. Commun dans toutes les zones agricoles du Québec.		2, 4
<i>Agelaius phœniceus</i>	Carouge à épaulettes	Marais à quenouille, bordures de milieux ouverts avec végétation dense. Plus fréquent au sud du Québec méridional.		2, 4
<i>Sturnella magna</i>	Sturnelle des prés	Champs. Extrême sud du Québec. Sporadique ailleurs.		2
<i>Euphagus carolinus</i>	Quiscale rouilleux	Proximité de l'eau.	Espèce susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable au Québec.	2, 4
<i>Quiscalus quiscula</i>	Quiscale bronzé	Habitats variés partiellement ouverts. Généralisé et fréquent au Québec méridional.		2, 4
<i>Molothrus ater</i>	Vacher à tête brune	Milieux ouverts, forêts fragmentées. Principalement associé aux milieux agricoles.		2, 4
<i>Icterus galbula</i>	Oriole du nord	Milieux ouverts dominés par les grands feuillus.		4
<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins	Forêts de conifères ou mixtes, lisières et ouvertures. Peu abondant dans l'ouest du Québec.		2, 4
<i>Carpodacus purpureus</i>	Roselin pourpre	Conifères de milieux variés. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	Présence liée à abondance de cônes (épinette blanche, pin blanc et pruche du Canada). Nomade, à déplacements irréguliers au Québec méridional.		2, 4
<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	Forêt boréale et occasionnellement dans les forêts mixtes. Partout au Québec méridional mais plus fréquent au delà du 48e parallèle.		2, 4
<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	Milieu arbustif arctique. Visiteur hivernal irrégulier au Québec méridional.		2
<i>Carduelis pinus</i>	Tarin des pins	Forêts mixtes et conifériennes. Grégaire. Nomade et erratique.		2, 4
<i>Carduelis tristis</i>	Chardonneret jaune	Habitats variés plus ou moins ouverts, lisière des forêts, clairières, proximité des rivières. Concentré à proximité des milieux urbains et ruraux.		2, 4
<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Gros-bec errant	Forêts de conifères matures et mixtes. Présence en lien avec la tordeuse. Généralisé au Québec méridional.		2, 4
PASSERIDAE				
<i>Anthus rubescens</i>	Pipit d'Amérique	Niche dans la toundra ou les hauts sommets. Observé en migration dans les milieux ouverts		2
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	Exclusivement associé aux milieux agricoles et urbains. Présence localisée au Témiscamingue.	Naturalisé	2, 4

* La nomenclature est celle de la liste de la faune vertébrée du Québec (MRNF, 2009)

Sources :

¹ Gauthier et Aubry, 1995

² Larivée, 2008

³ Service des parcs, observations faites sur le terrain en 2005, 2008, 2009 et 2010

⁴ MRNF, données non publiées

⁵ Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), 2009